

Что такое африканская чума свиней?

Африканская чума свиней (АЧС), африканская лихорадка, восточноафриканская чума - относится к списку А согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Источник возбудителя инфекции —больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями. Свиньи остаются заражёнными в течение нескольких месяцев, но выделяют вирус только в течение 30 дней. Вирулентный вирус долго находится только в лимфатических узлах, в других тканях он содержится в течение 2-х месяцев после заражения. **Механическими переносчиками вируса могут быть** птицы, люди, домашние и дикие животные, грызуны, **накожные паразиты** (некоторые виды клещей, зоофильные мухи, вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями.

Инкубационный период может продолжаться от 2 до 6 суток.

Течение подразделяют на молниеносное, острое, и реже хроническое. Болезнь протекает: сверхостро (2-3 суток), остро (7-10 суток) и реже хронически (2-10 месяцев).

Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда. На коже в области внутренней поверхности бёдер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют (резко выраженный цианоз кожи).

Лечение запрещено.

Чтобы не допустить заражения свиней африканской чумой в свиноводческих хозяйствах, необходимо следить за качеством кормов, состоянием иммунной системы животных.

ОБУ «СББЖ Железнодорожного района и города Железнодорожска» доводит до жителей Железнодорожного района и г.Железнодорожска информацию о том, что все животные подлежат учету и идентификации. Необходимо своевременно сообщать о приобретенных животных

За более подробной информацией обращаться в ОБУ «СББЖ Железнодорожного района и г.Железнодорожска» тел.: 8 (47148) 2-60-99.